

Maisons-Alfort, le 16 avril 2007

## AVIS

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

**de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments  
relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'une préparation à  
base de glyphosate destinée au traitement en jardin d'amateurs (Roundup Allées  
et Terrasses), produite par la société Monsanto après inscription de la substance  
active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE**

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a finalisé l'examen d'un dossier commun à plusieurs préparations à base d'un herbicide, le glyphosate produit par la société Monsanto, après inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, concernant une demande d'autorisation de mise sur le marché pour laquelle, conformément à l'article L.253-4 du code rural, l'avis de l'Afssa relatif à l'évaluation des risques sanitaires et de l'efficacité de ces préparations est requis.

Le présent avis porte sur la préparation Roundup Allées et Terrasses à base de glyphosate, destinée au désherbage des allées et abords non plantés en jardin d'amateurs.

Il est fondé sur l'examen du dossier déposé pour cette préparation, en conformité avec les exigences de la directive 91/414/CEE<sup>1</sup>, dans le respect des bonnes pratiques agricoles (BPA) et conformément à l'avis<sup>2</sup> à tous les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour les spécialités commerciales à base de glyphosate.

La préparation Roundup Allées et Terrasses disposait d'une autorisation de mise sur le marché AMM n° 9800037. En raison de l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (Directive 2001/99/CE transposée par l'arrêté du 26 novembre 2001), les risques liés à l'utilisation de cette préparation doivent être réévalués sur la base des points finaux de la substance active.

Après consultation du Comité d'experts spécialisé "Produits phytosanitaires : substances et préparations chimiques", réuni les 19 et 20 décembre 2006, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant.

### **CONSIDÉRANT L'IDENTITÉ DE LA PRÉPARATION**

La préparation Roundup Allées et Terrasses est un concentré soluble de couleur jaune à base de glyphosate acide d'origine Monsanto (pureté minimale de 95%) à 120 g/L (162 g/L de sel d'isopropylamine), appliquées en pulvérisation. Les usages demandés sont mentionnés à l'annexe 1.

### **CONSIDÉRANT LES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES ET LES MÉTHODES D'ANALYSES**

Les spécifications de la substance active entrant dans la composition de la préparation permettent de caractériser cette substance active et sont conformes aux exigences réglementaires.

<sup>1</sup> Directive transposée en droit français par l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94/359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

<sup>2</sup> Avis du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales paru au Journal Officiel du 8 octobre 2004

Les propriétés physiques et chimiques de la préparation Roundup Allées et Terrasses ont été décrites et les données disponibles permettent de conclure que la préparation n'est pas explosive, ni oxydante, ni auto-inflammable ( $t^{\circ}$  d'auto inflammabilité : 443 °C), qu'elle est stable dans son emballage pendant au moins 2 ans à 20 °C et que les spécifications FAO 2000/2001 sont respectées.

La préparation ne devra pas être mélangée à d'autres produits chimiques en raison d'incompatibilité physique ou chimique.

Concernant les propriétés techniques de la préparation, les données disponibles permettent de s'assurer de la sécurité de l'utilisation de cette préparation dans les conditions d'emploi préconisées.

Les méthodes d'analyse de la substance active dans la préparation et dans les différents substrats (végétaux, sol, eau et air) sont fournies et sont conformes aux exigences réglementaires. Les limites de quantification (LQ) du glyphosate et du métabolite AMPA (acide aminométhylphosphonique) dans les différents milieux sont les suivantes :

eau : 0,1 µg/L.

air : 7 à 8 µg/m<sup>3</sup>

sol : 0,05 mg/kg

végétaux : 0,05 mg/kg

#### **CONSIDERANT LES PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

La dose journalière admissible (DJA) du glyphosate acide, fixée dans le cadre de son inscription à l'annexe I, est de 0,3 mg/kg p.c.<sup>3</sup>/j. Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet obtenue dans une étude de 2 ans par voie orale chez le rat.

Les études (à l'exception de l'étude de sensibilisation) ont été réalisées avec une préparation de même concentration en substance active et qui ne diffère que par deux constituants mineurs non classés du point de vue toxicologique. L'étude de sensibilisation a été réalisée avec une formulation plus concentrée en substance active et en surfactant irritant. Les résultats sont les suivants :

- DL50<sup>4</sup> par voie orale chez le rat supérieure à 5000 mg/kg p.c. ;
- DL50 par voie cutanée chez le rat supérieure à 4000 mg/kg p.c. ;
- effet très irritant oculaire chez le lapin ;
- effet légèrement irritant cutané chez le lapin ;
- pas d'effet de sensibilisation cutanée chez le cobaye.

Au vu de ces résultats, cette préparation ne nécessite pas de classement relatif à la toxicité aiguë par voie orale et cutanée et au potentiel irritant cutané et sensibilisant. La préparation sera classée Xi R41 en raison de l'effet très irritant oculaire chez le lapin avec les phrases de précaution S26 (en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste) et S39 (porter un appareil de protection des yeux/du visage).

La toxicité aiguë par inhalation n'a pas été étudiée dans la préparation. En raison de la concentration du surfactant dans cette préparation et en l'absence de données sur la toxicité par inhalation de ce surfactant, la préparation est classée Xn R20 (nocif par inhalation) avec la phrase de précaution S46 (en cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette).

<sup>3</sup> p.c. : poids corporel

<sup>4</sup> Pour une espèce donnée, la DL50 est la Dose Létale (mortelle) en substance active, pour 50 pour cent d'un lot d'animaux de laboratoire soumis au test après une administration unique de la substance active.

**CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A L'EXPOSITION DE L'OPERATEUR, DES PERSONNES PRESENTES ET DES TRAVAILLEURS**

Le niveau acceptable d'exposition pour l'opérateur (AOEL) pour le glyphosate acide, fixé dans le cadre de son inscription à l'annexe I, est de 0,2 mg/kg p.c./j. Il a été déterminé en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet obtenue dans une étude de tératogenèse par voie orale chez le lapin. L'absorption cutanée retenue pour l'évaluation de l'exposition de l'opérateur est de 3 % (déterminée à partir notamment d'une étude *in vitro* sur peau humaine et d'une étude *in vivo* chez le singe Rhesus).

En considérant les conditions d'application suivantes de la préparation Roundup Allées et Terrasses pour le jardin d'amateur, l'exposition systémique des applicateurs a été estimée sur la base des études disponibles (UPJ, 2005<sup>5</sup>) :

- dose d'emploi : 18 L/ha, soit 2160 g sa<sup>6</sup>/ha ;
- concentration en sa dans la bouillie : 6,49 g/L ; volume de bouillie par surface : 0,0333 L/m<sup>2</sup>
- méthode d'application : pulvérisation ; appareillage utilisé : pulvérisateur à pression préalable.

Les expositions estimées par ce modèle, exprimées en pourcentages de l'AOEL, sont les suivantes :

	% AOEL
sans gants	12
avec gants pendant la préparation	5

Ces résultats montrent que la présence de gants lors des opérations de préparation de la bouillie réduit l'exposition de l'opérateur d'un facteur 2,4.

Au regard de ces résultats, il est estimé que le risque sanitaire des applicateurs en jardin d'amateur est considéré comme acceptable avec ou sans port de gants pendant la manipulation de cette préparation. Compte tenu de l'usage en jardin d'amateurs, le port de gants est cependant recommandé (S37 : porter des gants appropriés).

Le risque pour les personnes (enfants par exemple) pouvant pénétrer sur les surfaces traitées n'a pas été évalué par le pétitionnaire. Cependant, en raison du classement R41 de la préparation, la rentrée dans la zone traitée ne devra pas se produire avant le séchage complet de la zone traitée.

**CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES AU DEVENIR ET AU COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT**

Conformément aux exigences de la Directive 91/414/CEE relatives au dossier Annexe III, les données relatives au devenir et au comportement dans l'environnement concernent la substance active et ses produits de dégradation. En ce qui concerne le glyphosate, les données ci dessous ont été générées dans le cadre de l'examen communautaire de la substance active. Elles correspondent aux valeurs de référence utilisées comme données d'entrée des modèles permettant d'estimer les niveaux d'exposition attendus dans les différents milieux (sol, eaux souterraines et eaux de surface) suite à l'utilisation du glyphosate avec chacune des préparations à base de glyphosate et pour chaque usage.

**Devenir et comportement dans le sol**

**Voies de dégradation dans le sol**

Le glyphosate se dégrade principalement par dégradation microbienne aérobie. La minéralisation représente de 5,8 à 80 % de la radioactivité en fin d'incubation (28-150 jours). Les résidus non-extractibles ont atteint un maximum de 8,4 à 40,3 % après 28-150 jours d'incubation.

<sup>5</sup> Etudes soumises par l'Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces verts en 2005 pour évaluer l'exposition des jardiniers amateurs

<sup>6</sup> sa : substance active

Le seul métabolite majeur (>10% de la radioactivité) identifié est l'AMPA (acide aminométhylphosphonique) qui représente au maximum 42,4 % de la radioactivité après 7 jours.

#### **Concentrations attendues dans le sol (PECsol)**

Les concentrations prévisibles dans le sol (PECsol) ont été calculées pour chaque usage dans 5 cm de sol, conformément aux recommandations de Focus<sup>7</sup> "persistence in soils" et à partir des paramètres suivants :

- pour le glyphosate :  $DT50^8 = 180$  jours, valeur maximale au laboratoire\*,
- pour l'AMPA :  $DT50 = 240$  jours valeur maximale au champ\*, pourcentage maximal de formation 42,4 % au laboratoire.

La PECsol maximale est de 1,4 mg glyphosate/kg sol, attendue après une application par tâche à la dose maximale de 2160 g sa/kg sol. Pour l'AMPA, la PECsol correspondante est de 0,4 mg AMPA/kg sol. Ces PECsol ont été utilisées pour évaluer le risque pour les organismes du sol.

#### **Persistance et risque d'accumulation**

Le glyphosate n'est pas considéré comme persistant au sens de l'Annexe VI de la Directive 91/414/CEE (Directive 97/57/CE). Un plateau d'accumulation pour l'AMPA a été déterminé par calcul et est de 5,62 mg/kg<sup>9</sup>.

#### **Transfert vers les eaux souterraines**

##### **Adsorption et mobilité**

Le glyphosate et l'AMPA sont considérés comme intrinsèquement immobiles (classification de McCall<sup>10</sup>).

#### **Concentrations attendues dans les eaux souterraines**

L'évaluation du risque de transfert du glyphosate vers les eaux souterraines a été réalisée selon les scénarios Focus ground water<sup>11</sup> au moyen des paramètres suivants :

- pour le glyphosate,  $DT50 = 36,5$  jours, moyenne champ normalisée\* ( $20^\circ\text{C}$ ,  $pF=2$ )  
 $K_{foc}^{12} = 21169 \text{ L.kg}^{-1}$  (moyenne)  
 $1/n^{13} = 0,96$  (moyenne)
- pour l'AMPA :  $DT50 = 146$  jours, moyenne champ normalisée\* ( $20^\circ\text{C}$ ,  $pF=2$ ),  
pourcentage maximal de formation 42,4% au laboratoire  
 $K_{foc} = 8027 \text{ L.kg}^{-1}$  (moyenne)  
 $1/n = 0,80$  (moyenne).

Les concentrations prévisibles dans les eaux souterraines (PECeso) calculées pour chaque usage pris indépendamment sont inférieures à la valeur réglementaire de 0,1 µg/L. Le risque de contamination des eaux souterraines par le glyphosate et l'AMPA est considéré comme acceptable pour les usages demandés, pris indépendamment. Ces conclusions n'appellent pas de phrase type de précaution.

<sup>7</sup> FOCUS (1997) Soil persistence models and EU registration, Doc. 7617/VI/96, 29.2.97

<sup>8</sup> DT 50 : Durée nécessaire à l'élimination de 50 % de la quantité initiale de la substance déterminée selon une cinétique de 1<sup>er</sup> ordre simple (SFO)

\* déterminée selon une cinétique de 1<sup>er</sup> ordre simple (SFO)

<sup>9</sup> European Commission (2002) Review report for the active substance glyphosate, Document 6511/VI/99-final, 21 January 2002

<sup>10</sup> McCall P.J., Laskowski D.A., Swann R.L., Dishburger H.J. (1981), Measurement of sorption coefficients of organic chemicals and their use in environmental fate analysis, In: Test protocols for environmental fate and movement of toxicants, Association of Official Analytical Chemists (AOAC), Arlington, Va., USA.

<sup>11</sup> FOCUS (2000) FOCUS groundwater scenarios in the EU review of active substances, Report of the FOCUS groundwater scenarios workgroup, EC document reference Sanco/321/2000, rev.2, 202pp

<sup>12</sup>  $K_{foc}$  : coefficient d'adsorption par rapport au carbone organique correspondant au coefficient d'adsorption de Freundlich ( $K_f$ )

<sup>13</sup>  $1/n$  : pente des isothermes d'adsorption

## Devenir et comportement dans les eaux de surface

### *Voies de dégradation dans l'eau et/ou systèmes eau-sédiment*

Le glyphosate est principalement dissipé de la phase aqueuse par adsorption rapide sur le sédiment (de 31 à 44 % de la radioactivité dans le sédiment après 1 jour et de 50 à 60 % de la radioactivité après 14 jours). Le glyphosate adsorbé est ensuite dégradé et dissipé sous forme de résidus liés. La minéralisation représente de 6 à 26 % de la radioactivité en fin d'incubation (91 jours). Les résidus non-extractibles ont atteint un maximum de 14 à 35 % après 91-100 jours d'incubation.

L'AMPA est le seul métabolite majeur (>10% de la radioactivité) identifié pour les systèmes eau/sédiment. Dans la phase aqueuse, il a atteint un maximum de 16 % (après 14 jours) et dans le sédiment, un maximum de 15,1 % (après 97 jours).

### *Vitesses de dégradation/dissipation dans l'eau et les systèmes eau-sédiment*

Pour le glyphosate, les valeurs de DT50 dans les eaux de surface (esu), dans le sédiment (sed) et dans les systèmes eau-sédiment (système total) retenues pour l'évaluation des risques sont :

- DT50esu : 10 jours, maximum phase aqueuse système eau/sédiment\*
- DT50sed : 146 jours, maximum système eau/sédiment total\*
- DT50système total : 146 jours, maximum système eau/sédiment total\*

Pour l'AMPA, les valeurs retenues pour l'évaluation des risques sont :

- DT50esu : 5 jours, maximum phase aqueuse système eau/sédiment\*
- DT50sed : 45 jours, maximum système eau/sédiment total\*
- DT50système total : 45 jours, maximum système eau/sédiment total\*

### *Concentrations attendues dans les eaux de surface*

L'évaluation du risque de transfert vers les eaux de surface a été réalisée en prenant en compte la dérive de pulvérisation comme principale voie d'entrée significative.

Les concentrations prévisibles maximales dans l'eau de surface (PECesu) sont les suivantes :

Pour le glyphosate : PECesu = 1,04 µg/L

Pour l'AMPA : PECesu = 0,11 µg/L

Ces PECesu ont été utilisées pour évaluer le risque pour les organismes aquatiques.

## Données de surveillance dans les eaux de surface et les eaux souterraines

Les données centralisées par l'Institut français de l'environnement (IFEN) concernant le suivi de la qualité des eaux souterraines montrent une conformité des résultats d'analyses avec la réglementation dans plus de 98% des cas pour la période 1997-2004<sup>14</sup> (soit plus de 11 000 analyses pour lesquelles les concentrations mesurées sont inférieures à 0,1 µg/l). Cependant, un peu moins de 2 % des résultats d'analyses ne sont pas conformes avec des concentrations comprises pour la plupart entre 0,1 et 1 µg/l, et moins d'une dizaine de concentrations mesurées sont supérieures à 2 µg/l.

En ce qui concerne le suivi de la qualité des eaux superficielles, les données de l'IFEN indiquent d'une part, que plus de 30 % des analyses réalisées entre 1997 et 2004 sont supérieures à 0,1 µg/l (soit environ 9000 analyses sur un total d'un peu plus de 29 000) et d'autre part que, 0,8 % des analyses sont supérieures à 2 µg/L. L'ensemble des résultats d'analyses est inférieur à la concentration sans effet prévisible sur les organismes aquatiques estimée à 60 µg/L (PNEC glyphosate).

Il convient de souligner que les données mesurées et recensées dans le rapport de l'IFEN, résultent d'un échantillonnage sur une période et à un temps donnés. Elles présentent l'intérêt de la mesure dans l'environnement en comparaison avec des estimations réalisées dans le cadre réglementaire de l'évaluation *a priori*. En contrepartie, l'intérêt des estimations réglementaires est

<sup>14</sup> Il convient de noter que depuis 1997, les techniques analytiques ont évoluées conduisant à l'abaissement des limites analytiques.

de pouvoir intégrer une grande diversité de situations. L'interprétation de l'ensemble des différences entre les données mesurées et calculées reste difficile dans l'état actuel de la connaissance. En revanche, ces approches sont complémentaires.

Pour les eaux souterraines, l'analyse globale des résultats mesurés pour le glyphosate indique un risque de déclassement au regard des critères requis pour préserver la qualité des eaux destinées au captage d'eau potable.

Pour les eaux de surface, les résultats mesurés pour le glyphosate indiquent un risque acceptable pour les organismes aquatiques. En revanche, ils indiquent un risque de déclassement au regard des critères requis pour préserver la qualité des eaux brutes destinées à la potabilisation. En ce qui concerne l'AMPA, les données mesurées indiquent également un risque de déclassement au regard des critères requis pour préserver la qualité des eaux brutes destinées à la potabilisation.

Les données mesurées soulignent que le suivi de la qualité des eaux doit être poursuivi et renforcé afin notamment de vérifier la pertinence et l'efficacité des mesures de gestion accompagnant les autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate.

### **Comportement dans l'air**

Compte tenu de sa faible pression de vapeur ( $1,3 \cdot 10^{-5}$  Pa à 25 °C), le glyphosate ne présente pas de potentiel de transfert significatif vers l'atmosphère.

## **CONSIDERANT LES DONNEES D'ECOTOXICITE**

### **Effet sur les oiseaux**

L'évaluation des risques pour des oiseaux herbivores et insectivores a été réalisée selon les recommandations du document guide européen Sanco 4145/2000. Cette évaluation prend en compte les niveaux de résidus mesurés dans les végétaux, ainsi que des niveaux standards de résidus pour les insectes du sol. Pour estimer les risques, l'évaluation est fondée sur les valeurs toxicologiques suivantes :

- pour une exposition aiguë, sur la DL50 de 2000 mg/kg p.c. (étude de toxicité aiguë chez le canard) ;
- pour une exposition à court terme, sur la DL50 de 1127 mg/kg p.c./jour (étude de toxicité alimentaire chez le colin de Virginie) ;
- pour une exposition à long terme, sur la dose la plus faible présentant un effet<sup>15</sup> de 96,3 mg/kg p.c./j (étude de toxicité sur la reproduction chez le colin de Virginie).

Les rapports toxicité/exposition (TER<sup>16</sup>) calculés pour la préparation conformément à la directive 91/414/EC qui sont supérieurs aux valeurs seuils proposées par l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, respectivement de 10 pour les risques aigus et court terme et de 5 pour le risque long terme, pour les usages impliquant une dose à l'hectare inférieure ou égale à 2160 g sa/ha (1800 g sa/ha en plein, 2160 g sa/ha en localisé).

L'évaluation des risques liés à l'utilisation de la préparation Roundup Allées et Terrasses montre que, pour les oiseaux, la marge de sécurité peut être considérée comme suffisante.

Le glyphosate ne présentant pas de potentiel de bioaccumulation, l'évaluation du risque d'empoisonnement secondaire n'est pas nécessaire.

<sup>15</sup> A cette dose, on note une diminution du poids des œufs de 8% sans conséquence sur le reste du développement.

<sup>16</sup> Le TER est le rapport entre la valeur toxicologique (DL50, CL50, dose sans effet, dose la plus faible présentant un effet) et l'exposition estimée, exprimées dans la même unité. Ce rapport est comparé à un seuil défini à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE en deçà duquel la marge de sécurité n'est pas considérée comme suffisante pour que le risque soit acceptable.



### Effet sur les mammifères

L'évaluation des risques a été réalisée pour des mammifères herbivores et insectivores selon les recommandations du document guide européen Sanco 4145/2000. Cette évaluation prend en compte les niveaux de résidus mesurés dans les végétaux et des niveaux standards de résidus pour les insectes et se fonde sur la DL50 supérieure à 5000 mg/kg p.c (étude de toxicité aiguë chez le rat) pour estimer les risques d'exposition aiguë et sur la dose sans effet de 462 mg/kg p.c./j (étude long terme chez le rat) pour estimer les risques liés à une exposition à long terme.

Les TER calculés conformément à la directive 91/414/CEE sont supérieurs aux valeurs seuils proposées par l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, respectivement de 10 pour le risque aigu et de 5 pour le risque long terme, pour les usages impliquant une dose à l'hectare inférieure ou égale à 2160 g sa/ha (1800 g sa/ha en plein, 2160 g sa/ha en localisé).

L'évaluation des risques liés à l'utilisation de la préparation Roundup Allées et Terrasses montre que, pour les mammifères, la marge de sécurité est considérée comme suffisante.

Le glyphosate ne présentant pas de potentiel de bioaccumulation, l'évaluation du risque d'empoisonnement secondaire n'est pas nécessaire.

### Effet sur les organismes aquatiques

La concentration sans effet prévisible (PNEC) dans l'environnement a été déterminée pour le glyphosate :  $PNEC_{\text{glyphosate}} = 60 \mu\text{g/L}$  (déterminée à partir de la CEB50<sup>17</sup> de 0,6 mg/L de l'étude de toxicité sur la croissance des algues *Skeletonema costatum*, à laquelle un facteur 10 a été appliqué). Le risque pour les organismes sédimentaires est évalué en se basant sur la concentration sans effet de 30 mg/L estimée chez *Daphnia magna* et en y appliquant un facteur de sécurité supplémentaire de 10. Le métabolite AMPA est deux fois moins toxique que la substance active sur une même espèce d'algue.

L'évaluation des risques pour les organismes aquatiques, a été réalisée à partir des résultats d'essai sur algue *Selenastrum capricornutum*. Ces résultats montrent que la préparation Roundup Allées et Terrasses présente une toxicité plus importante (exprimée par la CEB50) que le glyphosate lui-même (CEB50 de la préparation = 20,8  $\mu\text{g/L}$  correspondant à 2,08  $\mu\text{g sa/L}$ , CEB50 glyphosate acide = 48 mg/L, soit un facteur 23000 entre les deux données).

Pour prendre en compte cette différence de toxicité, correspondant à un facteur de 23000, entre la substance active et la préparation, l'application de ce facteur à la PNEC du glyphosate conduit à classer la préparation Roundup Allées et Terrasses dans la classe de risque 4 (zone non traitée supérieure à 100 mètres par rapport aux points d'eau) pour les usages aux doses inférieures ou égales à 2160 g sa/ha.

L'évaluation du risque pour les organismes aquatiques en relation avec le drainage a été réalisée pour des doses inférieures ou égales à 1800 g sa/ha et a permis de déterminer une PEC<sup>18</sup>. Les rapports PEC/PNEC étant inférieurs à 1, les quantités de glyphosate ou d'AMPA apportées par le drainage ne sont pas considérées comme une source de risque pour les organismes aquatiques.

Le glyphosate n'est pas bioaccumulable et une évaluation spécifique n'est pas requise.

La préparation Roundup Allées et Terrasses est classée N R50/53 (Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique). Cette préparation étant en classe de risque 4 pour le risque pour les organismes aquatiques, il n'est pas possible de proposer de phrase de précaution adéquate par rapport à ce risque.

### Effet sur les abeilles

L'évaluation des risques pour les abeilles a été réalisée en se fondant sur des essais de toxicité aiguë 48h par contact et par voie orale sur *Apis mellifera* réalisés avec une préparation plus

<sup>17</sup> CEB50 : concentration d'une substance produisant 50% d'effet sur la biomasse algale

<sup>18</sup> PEC : Concentration prévisible dans l'environnement (predicted environmental concentration)

concentrée en substance active (34,4% vs 10,1%). Les quotients de risque calculés pour ces deux voies d'exposition étant inférieurs à la valeur seuil de 50, proposée par l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, le risque pour les abeilles, lié à l'utilisation de la préparation Roundup Allées et Terrasses, est considéré comme acceptable et répond aux exigences de la Directive 91/414/CEE.

#### **Effet sur les arthropodes autres que les abeilles**

Des données d'écotoxicité relatives à la préparation plus concentrée en substance active (34,4% vs 10,1%) ont été fournies pour 4 espèces dont deux espèces standards (critères suivis selon les espèces : survie et prédation ou fécondité ou parasitisme). Les résultats montrent que les effets sont non significatifs à 2384 g sa/ha. Le risque pour ces organismes est considéré comme acceptable au regard des critères de la directive 91/414/CEE.

#### **Effets sur les vers de terre et autres macro-organismes non ciblés du sol supposés être exposés à un risque**

L'évaluation des risques pour les vers de terre a été réalisée à partir des résultats d'un essai de toxicité aiguë 14 j sur *Eisenia fetida* avec la préparation plus concentrée et d'un essai de toxicité sur la reproduction avec la substance active et en prenant en compte la PEC maximale attendue pour le glyphosate de 2,88 mg/kg, suite à l'application sur sol nu de 18 L/ha de préparation apportant 2160 g sa/ha (pas d'interception).

Ces résultats permettent de calculer, pour la préparation Roundup Allées et Terrasses, les TER qui sont supérieurs aux valeurs seuils fixées par la Directive 91/414/CEE, respectivement de 10 pour le risque aigu et de 5 pour le risque long terme.

La présente évaluation couvre l'exposition aux produits de dégradation de la substance active dans le sol.

#### **Effets sur les microorganismes non ciblés du sol**

L'évaluation des effets sur les microorganismes du sol a été réalisée à partir des résultats d'un essai d'écotoxicité réalisé avec la préparation plus concentrée. Les résultats montrent que l'on n'observe pas de déviation de plus de 25% par rapport au témoin de la transformation de l'azote et de la minéralisation du carbone après 28 j aux doses appliquées 10,8 et 54 L de formulation /ha soit 5,76 et 28,81 mg sa /kg de sol. Sur la base de ce critère, l'évaluation des risques liés à la préparation Roundup Allées et Terrasses répond aux exigences de la directive 91/414/CEE. Elle couvre l'exposition aux produits de dégradation de la substance active dans le sol.

#### **Effets sur d'autres organismes non ciblés (flore et faune) supposés être exposés à un risque**

Des données d'écotoxicité relatives à la substance active ont été fournies. L'évaluation des risques liés à l'impact d'un traitement avec la préparation Roundup Allées et Terrasses sur les plantes non ciblées montre que, dans le cas d'une application maximale de 18 L/ha de préparation apportant 2160 g sa/ha (1800 g sa/ha en plein, 2160 g sa/ha en localisé), le TER est supérieur à la valeur seuil de 5 pour une dérive de pulvérisation de 10 mètres.

La préparation Roundup Allées et Terrasses appartient à la classe de risque 1 avec la phrase type de précaution Spe3 : pour protéger les plantes non ciblées, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

#### **CONSIDERANT LES DONNEES BIOLOGIQUES**

Le glyphosate est un herbicide foliaire systémique à large spectre non sélectif des cultures qui agit en inhibant l'activité enzymatique de la 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) impliquée dans la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Cette inhibition, en provoquant l'arrêt de la synthèse de ces acides aminés, entraîne la destruction de la plante.

Les données fournies dans le dossier biologique (essais effectués selon les exigences réglementaires) ou les extrapolations justifiées ont permis d'évaluer le niveau d'efficacité de la préparation Roundup Allées et Terrasses.



Le niveau d'efficacité a été considéré comme satisfaisant pour des usages et des doses conformes à l'avis du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales paru au Journal Officiel du 8 octobre 2004 concernant la mise sur le marché des spécialités commerciales à base de glyphosate.

Cependant, compte tenu de l'existence reconnue de cas de résistance au glyphosate à travers le monde, il convient de rester particulièrement vigilant afin de conserver l'efficacité du glyphosate sur certaines plantes. La mise en place d'un suivi post-autorisation pour les préparations à base de glyphosate permettrait d'étudier l'apparition ou le développement éventuel d'une résistance sur les adventices et plus particulièrement sur :

- Ray grass (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L. et *Lolium rigidum* Gaud.),
- Érigéron (ou Vergerette) du Canada (*Conyza canadensis* (L.) Cronq.),
- Ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia* L.).

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que :

- A.** les risques liés à l'utilisation de la préparation Roundup Allées et Terrasses pour les usages demandés en jardin d'amateurs pour des zones non agricoles sont considérés :
- pour les applicateurs, comme acceptables, uniquement avec port de protections appropriées pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement ;
  - pour les organismes aquatiques, comme inacceptables pour tous les usages revendiqués (classe de risque aquatique 4) ;

**Classement de la préparation :** Xn N R20<sup>19</sup> R41<sup>20</sup> R50/53<sup>21</sup> S26<sup>22</sup> S37/39<sup>23</sup> S46<sup>24</sup> S60<sup>25</sup> S61<sup>26</sup> SP1 SPe3

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ;

SPe3 : Pour protéger les plantes non ciblées, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

En raison du classement R41 de la préparation, la rentrée dans la zone traitée ne devrait pas se produire avant le séchage complet de la zone traitée.

**Classe de risque aquatique :**

Classe 4 : zone non traitée supérieure à 100 mètres par rapport aux points d'eau aux doses inférieures ou égales à 2160 g sa/ha ;

**Classe de risque terrestre (arthropodes non ciblés autres que les abeilles) :** non classé ;

**Classe de risque terrestre (plantes non ciblées) :** Classe 1 ;

La mention suivante devrait figurer sur l'étiquette : "Ne pas mélanger la préparation avec d'autres produits chimiques".

- B.** le niveau d'efficacité de la préparation Roundup Allées et Terrasses est satisfaisant. Néanmoins, il conviendrait de mettre en place pour les préparations à base de glyphosate un suivi post-autorisation permettant d'étudier l'apparition ou le développement éventuel

<sup>19</sup> R20 Nocif par inhalation

<sup>20</sup> R41 Risque de lésion oculaire grave

<sup>21</sup> R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

<sup>22</sup> S26 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

<sup>23</sup> S37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage

<sup>24</sup> S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

<sup>25</sup> S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

<sup>26</sup> S 61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

d'une résistance sur les adventices avec une attention particulière pour des adventices telles que :

- Ray grass (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L. et *Lolium rigidum* Gaud.),
- Érigéron (ou Vergerette) du Canada (*Conyza canadensis* (L.) Cronq.),
- Ambroisie (*Ambrosia artemisiifolia* L.).

et de fournir des rapports d'études tous les 2 ans à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

En conséquence, considérant l'ensemble des données disponibles, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis défavorable pour la mise sur le marché de la préparation Roundup Allées et Terrasses au regard des risques identifiés pour la faune aquatique. Par ailleurs, malgré une efficacité suffisante de la préparation, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments considère que la préparation n'apporte pas de bénéfice agronomique supérieur à celui des préparations existantes.

**Pascale BRIAND**

**Annexe 1**

Liste des usages figurant dans le formulaire CERFA pour la préparation soumise à la réévaluation  
 ROUNDUP ALLEES ET TERRASSES (AMM n° 9800037)

<b>Substances</b>	<b>Composition de la préparation</b>	<b>Dose de substance active</b>
Glyphosate (forme acide)	120 g/L (10,1 % poids/poids)	1800 – 2160 g sa/ha/an

<b>Usages selon futur catalogue et avis glyphosate</b>	<b>Doses</b>	<b>Usages du catalogue actuel</b>
<u>00301054</u> Jardin d'amateur * désherbage allées de parcs, jardins publics et trottoirs, abords non plantés * <i>Flore facile</i>	15 L/ha par taches (1800 g sa/ha)	<u>11015903</u> : Traitements généraux * désherbage * allées de parcs, jardins publics et trottoirs
<u>00301054</u> Jardin d'amateur * désherbage allées de parcs, jardins publics et trottoirs, abords non plantés * <i>Flore difficile</i>	18 L/ha par taches (2160 g sa/ha)	<u>11015903</u> : Traitements généraux * désherbage * allées de parcs, jardins publics et trottoirs